| 大腸がん | CAPOX（3週1コース） |
|---|---|

諏訪中央病院
Suwa Central Hospital

| | 医薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与スケジュール(3週1コース) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Rp.1 | デキサート注 | 9.9mg | 点滴静注<br>200mL/hr（15分） | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | パロノセトロン注 | 0.75mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ファモチジン注 | 20mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5%ブドウ糖液 | 50mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | オキサリプラチン注 | 130mg/㎡ | 点滴静注<br>＿＿mL/hr（120分） | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5%ブドウ糖液 | 250mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注<br>（フラッシュ用） | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | カペシタビン錠 | 2000mg/㎡ | 経口<br>1日2回　朝、夕食後 | 夕<br>● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●<br>朝 | | | | | | |
| Rp.5 | デカドロン錠 | 8mg/day | 経口<br>1日2回　朝、昼食後 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |