

吸入指導報告書(レスピマツト用)

診療科: _____

発行日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

患者ID: _____

患者名: _____

<吸入手順> (ポンペの装着は患者さんと、やり方を共有しながら薬剤師が行うようにしてください)
○空噴霧 キャップを閉じた状態で上向きにして持ち、透明ケースを矢印の方向にカチッと音がするまで180度回転させる
キャップを開け吸入口を下に向け噴霧ボタンを押しミスト(霧)が見えるのを確認後、キャップを閉じる
※空噴霧は4回繰り返してください。(5回目から吸入可能)
①残量を確認し、透明ケースを矢印の方向にカチッと音がするまで180度回転させた後、キャップを開ける
②無理しない程度に「フー」と息を吐きだす(吸入口には息を吹きかけない)
③吸入口をくわえ、噴霧ボタンを押すと同時に、2秒以上かけてゆっくり吸い込む
④吸入口から口を離し、5秒程度息を止める
⑤息をゆっくりとはき出す
⑥使用後はキャップを閉める
⑦吸入後は必ずうがいをする。

指導対象者 本人 家族 その他(_____)

吸入速度チェックキットによる吸気流速の確認 問題あり 問題なし

吸入補助具の使用 なし あり(補助具の名前: _____)

吸入薬による副作用 嘔声 口腔カンジタ 動悸・振戦 その他(_____)

吸入指導の結果 問題なし 改善すべき点あり(問題のある番号: _____)
 吸入困難(疑義照会をお願いします)

担当薬剤師コメント

保険調剤薬局名: _____

担当薬剤師名: _____

患者記入欄

【COPDの方】

まったく咳が出ない	0	1	2	3	4	5	いつも咳が出ている
まったく痰が詰まった感じがしない	0	1	2	3	4	5	いつも痰が詰まった感じがする
まったく息苦しくない	0	1	2	3	4	5	非常に息苦しい
坂や階段を登っても息切れがしない	0	1	2	3	4	5	坂や階段を登ると非常に息切れがする
家での普通の生活が制限されることがない	0	1	2	3	4	5	家での普通の生活が非常に制限される
肺の状態を気にせずに外出できる	0	1	2	3	4	5	肺の状態が気になって外出できない
よく眠れる	0	1	2	3	4	5	肺の状態が気になってよく眠れない
とても元気だ	0	1	2	3	4	5	まったく元気がない

保険薬局の方へ

この吸入指導報告書を諏訪中央病院(0266-71-2051)にFAXをお願い致します。