

【HMG-CoA還元酵素阻害薬（スタチン）】

| 推奨度  | 薬品名<br>(先発品名)              | 採用規格        | 薬価                      | 強さ    | 性質  | 薬物代謝               | 相互作用                                   | 腎機能低下時の投与                         | 糖代謝への影響            |
|------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 第1推奨 | アトルバスタチン錠<br>(先発品:リピトール)   | 5mg<br>10mg | 5mg:11.5円<br>10mg:10.8円 | ストロング | 脂溶性 | CYP3A4で代謝          | 併用禁忌薬あり<br>マヴィレット配合錠(C型肝炎治療薬)<br>と併用禁忌 | 通常用量で投与可能<br>糸球体濾過量保持作用が<br>示唆される | 用量依存的に<br>悪化のリスクあり |
|      | ロスバスタチンOD錠<br>(先発品:クレストール) | 2.5mg       | 2.5mg:10.8円             | ストロング | 水溶性 | CYPでほとんど<br>代謝されない | 併用禁忌薬あり<br>シクロスポリンと併用禁忌                | 減量・慎重投与<br>(開始2.5mg/日、最大5mg)      | 用量依存的に<br>悪化のリスクあり |
| 第2推奨 | ピタバスタチンCa・OD錠<br>(先発品:リパロ) | 1mg         | 1mg:10.8円               | ストロング | 脂溶性 | CYPでほとんど<br>代謝されない | 併用禁忌薬あり<br>シクロスポリンと併用禁忌                | 通常通り使用可能<br>(慎重投与)                | 悪化させにくい            |

# 【HMG-CoA還元酵素阻害薬（スタチン）】

## 等価換算

| 比較表                        | 作用比較表(1日量) |        |       |       |       |
|----------------------------|------------|--------|-------|-------|-------|
| アトルバスタチン錠<br>(先発品:リピトール)   | 5 mg       | 10 mg  | 20 mg | -     | -     |
| ロスバスタチンOD錠<br>(先発品:クレストール) | -          | 2.5 mg | 5 mg  | 10 mg | 20 mg |
| ピタバスタチンCa・OD錠<br>(先発品:リバロ) | 1 mg       | 2 mg   | 4 mg  | -     | -     |

換算量は目安であり、個人により反応性は異なります。

切り替え時には、適応症、相互作用、腎機能を確認し、切り替え前後には、肝機能をモニターしてください。